

Rapport

Monsieur Maigrot Maître en Chirurgie à Ransonnière
à l'envoyé à l'Académie des observations qu'elle nous
a chargé d'examiner.

1^{re} observation

La première observation a pour objet un dépôt, dans les os
maxillaire d'un qui après avoir détruit les fétorifères pour
par plusieurs petits trous à la joue. Le Malade après un
traitement d'une année sans succès fut trouvé M. M.
En homme intelligent, il visita la bouche et y découvrit une
petite ouverture dans deux dents molaires qui, depuis
trois mois donnaient issue à un peu de pus; le stilet qu'il y intro-
duisit, et qui entra dans les os maxillaire, fut suivi,
en le retirant, d'une assez grande quantité de matière puru-
lente, de quoi le déterminant à ôter ces deux dents, à aggra-
ver l'ouverture avec un trocart, et à injecter, à la faveur
de cette ouverture, dans les os maxillaire pur qui a produit
dilatation; ayant eu attention pendant les 20 premiers jours
de laisser une canule de plomb. Il obtint la guérison de
cette maladie au deux mois.

Le Chirurgien est toujours sûr de tout, le fait que la nature
lui prouve la route qu'il doit tenir. La matière purulente,
par son séjour, avoit rompu les parties de l'os maxillaire qui
venoit à ces deux dents molaires, c'est la pente naturelle.
M. M. n'étant cessée, ôte ces deux dents, et brise
toutes les parties de l'os maxillaire qui avoient pu
s'opposer au libre écoulement du pus. C'est ce qui a
vécu; mais ne pourroit-on pas demander à M. M. si il n'eût
pas pu se dispenser d'introduire pendant 20 jours une canule
de plomb dans une ouverture assez dilatée?
Cette observation ne peut paraître avoir été d'assez intéressante

pour être employée dans les ouvrages de l'Académie, si l'enfant
par l'écoulement lorsqu'elle traitera de, maladies des femmes, de la
bas du vase.

II^e observation

Dans la 2^e observation d'un dépôt purulent fait par
congestion formant une tumeur qui s'étendait depuis la région lombaire
lombaire droite jusqu'à la ligne blanche. Les tumeurs qui l'entouraient
incommodes étaient étrangères, il y avait un an qu'il avait
commencé, et s'était accru insensiblement lorsque M. M...
fut consulté. Découvrant une fluctuation fort étendue, il
fit une incision perpendiculaire au corps à la partie la plus déclive
de la tumeur à côté de l'épine. Il sortit d'abord six pintes
de pus, et une grande quantité les 15 premiers jours; mais, au
moyen de pansements légers, aidés de la situation de la
malade, il obtint, au mois, une parfaite guérison.
La réflexion sur cette observation est que dans le cas simple,
quelque étendue qu'elle soit, lorsqu'elle est v'assemblée,
une médiocre incision à la partie la plus basse suffit. Cette
réflexion - ne saurait avoir aucun difficile, et nous sommes très d'accord avec.
mais, en nous faisant l'usage de l'état de la maladie, par lequel nous
dit-il, voyez ces accidents qui nous accompagnent le commencement
et le progrès? cela aurait pu lui servir de leçon de dépôt par congestion.
L'observation, telle qu'elle est, ne peut être d'aucune utilité pour l'Académie
quoiqu'on puisse regarder comme un excellent la sortie de six pintes
de pus à l'instant de l'ouverture.

III^e observation

Il s'agit dans la 3^e observation d'un abcès sur une ancienne hernie.
Une femme âgée portait depuis plus de 20 années une hernie inguinale
qui avait dans les premiers temps, effrayé les accidents de l'étranglement,
d'après lesquels les intestins avaient contracté adhérence avec
l'anneau. Il survint sur la tumeur une inflammation considérable,
la fièvre, la tension du bas ventre se joignirent sans qu'aucun de
ces accidents ait dérangé l'évacuation ordinaire des matières fécales,
ni causé aucun dérangement dans l'utérus, et l'abdomen. Les saignés

les cataplasmes, ne luy guérissent pas, qu'il se formât un abcès que M. M.
reconnut par la fluctuation qui étoit très sensible, et dans l'étendue
de laquelle, en appuyant fort, il distinguoit l'intestin dur et gonflé.
Il crut alors devoir prendre des précautions pour ménager l'intestin,
en faisant l'incision, et pour cela il fait pincer la peau, et
former un pli considérable sur la tumeur, fait son incision
parallèle au long, suffisante pour permettre l'écoulement du
pus sans lésion de l'intestin, à découvrir, et l'infirmité beaucoup, et
d'une très mauvaise odeur, il finit par sonder, et voyant fusi-
blement la portion de l'intestin qui formoit une anse assez longue,
dénudée de son sac fibreux, ayant des tuniques lisses, dures et
gonflées à cause de l'impression du pus; le docteur et la fièvre
cessent de l'instant de l'opération. après un appareil convenable
des pansements pendant un mois la malade fut parfaitement
guérie. L'intestin restait adhérent à la cicatrice.
L'observation précédente à sa juste valeur n'offre qu'un abcès sur une
ancre formée qu'en part l'incision. La précaution de l'opération
en ouvrant le dépôt, le jugement qu'il porte de l'état des parties,
qui s'y trouvoient, exigeoit une implication. On pourroit,
par exemple, demander à M. M. si c'étoit nécessaire ou si il a pu
facilement, par le pincement faire faire un grand pli à la
peau qui formoit une tumeur circonscrite et assez étendue pour la
présenter d'une grande quantité de pus) pour ne luy permettre de
toucher l'intestin qu'en la appuyant un peu fort.
Et pour cet effet un dépôt dont la matière, fuyant sous la pression,
luy auroit fait reconnaître qu'elle avoit plusieurs foyers dans la
circonférence, ou que la communication avec l'abcès étoit bise,
cette précaution auroit été nécessaire, mais, cette tumeur se gonfle,
soulève par le pus qui, se présentant la avant, l'éloigne
l'intestin de l'abcès du bistouri tenu par un praticien supposé que
on M. M. d'ailleurs n'auroit pu par la pression de l'abcès dans le pli de la
ancre parer les dangers de l'opération, car on ne peut pas se fier à la

peau et de la queue sans cette précaution qui seroit peut-être impossible.
On pourroit bien demander à M. M. comment les tumeurs se
sont élevées, etant, ce qui n'est pas ordinaire, dures et gonflées par l'impur-
-té de la matière purulente, la maladie n'avoit effrayé aucun
des accidents qui suivent nécessairement son altération, ni la
gêne de quelque partie intestinale.
Comme j'étois assuré que l'intestin, qui n'avoit tant de peine
à se débarrasser, n'avoit pas cessé de fonctionner.
Il m'est d'ailleurs observé qu'un grand nombre d'anciens hernies,
le sac herniaire avoit acquis une épaisseur et une dureté considérables.
Ce qui probablement se trouvoit dans le cas exposé.
M. M. observant toute la liaison, son observation peut valoir.

IV observation
Le sujet de la 4^e observation étoit un homme entre les années de 20 ans à la suite
d'une fièvre continue. La maladie fut d'abord une douleur
fixe à la région épigastrique, le bas ventre tendit, devint douloureux,
la fièvre, les frissons, les vomissements, les saignements, le
régime, les topiques furent employés, et la douleur se fixa à
l'épigastre où se forma une tumeur qui s'étendoit sur tout
l'hypocoste droit. Les cataplasmes molles décidèrent la
suppuration dans le lieu de la douleur. M. M. pénétra
dans le foyer de suppuration jusqu'à la cavité de la fibre,
du muscle droit, il lui fit beaucoup de pus, l'écoulement de son
sang lui fit reconnaître la position dans son latic, il pensa
la plaquer avec des bons onguents, mais l'écoulement s'étendit
toute la maladie guérit le peu de temps.

Il n'y a point de doute d'intérêt dans cette observation pour
l'Académie, c'est un dépôt critique que M. M. à avoir comme
on a vu tout ce qui de cette espèce, et qu'il a guéri.
La Reflexion qu'il fait sur les sorts de dépôts est de les ouvrir
de bonne heure pour prévenir les défordres que l'altération
peut en occasionner, et de leur communiquer le virus de la matière fécale
pour en occasionner dans les parties voisines.

qu'il fut en il par un air de bonne heure. Il n'a aperçu qu'un air de la
fluctuation de la poche, et l'ulcère s'est très bien fait; mais l'issue de
l'écoulement qu'il employait dans les pansements, n'était-il pas, dans
le cas, un remède trop précoce?

5^e observation
Le cas de la 5^e observation est un abcès dans le tissu lactaire
qui s'est ouvert par un orifice, qui avait atteint l'organe, et dont
la nature était purulente dans la poitrine.

Un homme de 21 ans au 8^e jour de son abcès eut une suppression de
l'écoulement qui fut suivie de fièvre, délire, convulsions, douleurs vives et
intenses, le long du dos et qui s'étendaient aux reins, aux aines, jusqu'à
l'anus, la région du bas ventre.

En même temps, le régime, les lavements, les topiques ne produisirent aucun
bon effet, suppression, la concentration du pus augmenta et le

danger. La maladie s'étant le 20^e de la maladie une douleur très
violente et lancinante qui s'étendait au long du dos, et qui s'étendait
intérieurement dans la poitrine, on lui fit à ce point qui s'étendait
de l'anus jusqu'à la région du dos. Les vomissements devinrent vagues, les flammes
et le loir ne parurent pas; le bas ventre s'ouvrit toujours sans succès. Le 30^e

le 30^e jour de la région, l'abcès devint d'une violence sans
limites. Application de cataplasmes, liniments, et autres, jusqu'au

40^e jour, sans succès. On fit une fluctuation profonde qui, 5 jours après,
devint assez sensible pour déterminer l'écoulement du pus; il y plongea

un bistouri (c'était à cet égard une erreur de jugement, car il s'agit d'un abcès)
il fit une incision longitudinale, il en sortit une quantité prodigieuse

de matière fétide mêlée avec beaucoup d'air, il y pénétra et on
l'agita, appliqua le topique, fit une incision de plus à

favoriser l'écoulement du pus. La nuit fut bonne, et le lendemain dimi-
nuèrent. Les chairs acquies par les incisions, et les organes, il

l'écoulement le pus, et les incisions qui s'en firent 3 fois par jour pendant
40 jours jusqu'à ce que l'écoulement se fût entièrement arrêté. On considéra de
nouveau, toujours avec beaucoup d'air, et donc la maladie



savoir si l'effluve lui supprimeant chaque fois à une corde au col du lit.
L'usage d'épilepsie, de mondificatifs, convertis d'un emplâtre de toulouze de
Caneilles, qu'on bibes, de liqueurs aromatiques, terminoient chaque
pansement; mais le vin, n'étant plus chargé de sucre, la saignée
valétoz diminuant, les chairs étant devenues vermeilles, il ne pouvoit
plus que malin et guéri, et au bout de 3 mois la malade fut parfaite-
ment guérie.

De cette observation il résulte d'abord M. M. 1^o que le pus avoit
détruit de la substance du veing, qui au bassinet puis qu'il en
sortoit par le veing. 2^o qu'il étoit pénétré dans la cavité de la
poitrine ou il faisoit en pénétrant le miel d'asth, qui faisoit que la
malade en quel point se soit sur le côté gauche, et conséquem-
ment qu'il y avoit communication de la poitrine au bas ventre;
ce qui donne lieu de penser, et qu'à la faveur de la contrainte
que la malade subissoit en se soullevant, elle obligeoit elle obligeoit
la matière contenue dans la poitrine à se serrer dans le bas
ventre pour sortir avec beaucoup d'air par la playe extérieure.
3^o Enfin qu'on vît dans la cavité de l'abdomen, lors qu'on
lui fit fréquemment et long temps les injections pour lui ôter
les matières qui parvenient de jour en jour.

Cette observation seroit certainement très intéressante; mais,
charge par l'Académie de lui rendre cette observation, nous
avons, beaucoup de symptômes, l'usage, et l'on auroit pu s'imp-
oser à son auteur. Il n'y auroit donc, pour s'opposer à notre
jugement, de l'observation qu'un simple dépôt lactéux, l'on a pu
prouver, et voici comment.

L'expression de l'écoulement de pus, de pus de pus, l'on a pu donner
une à un transport de matière lactée, tant qu'elle aura l'écou-
lement avec la saignée, elle aura aussi la fièvre, le délire, les convulsions, les
douleurs vagues, si elle est dans le tissu adipeux d'un organe, elle y
aura produit une inflammation qui se sera communiquée à
cet organe par la lymphe, les veines, ou par les fluxions,
et la petite quantité.
Inflammation à quelque partie du bas ventre, se communiquant
communiqué

[illegible]

appréhend' telle par, que d'un par, forme d'un d'autre, partie, s'il est possible
porté sur ce, organes? qu'on a souvent vu vuider une matière lactée
par le vomir par le felle? Le 8. Les vides, ne déposent elle, par
quelque fois une matière blanche, et opaque qui lui donne
l'apparence d'un nouveau lait.

Le Malade n'a eu ny nausées ny vomissements, ny fluxus, ny diarrhées, de
satisfaction de l'urine. D'ailleurs il n'a eu aucune question
qu'il soit sorti par la playe, comme s'il y en avait, une
matière purulente aqueuse, opaque d'une d'urine.

La négligence de M. M. dans l'inspection des circonstances ne
doit elle pas, nous mettre dans le cas, de douter de l'abaissement?

Quant au précepte qui donne d'injecter fréquemment dans
les abcès internes, pour lever, et éliminer les matières, qui pourroient
s'y former, il me parait assez de regard, car l'air, avec l'urine, l'urine,
de la nature, et conséquemment avec le sérum, de l'air.

Après ce précepte, il en est appelé à la pratique, par quelques
maîtres, ou lais qui ont employé les injections, dans les abcès de
la substance du rein, non, leur rapportement au sérum, et à l'urine
sont déterminés, qui le prouve avoir ^{reconnu} dans l'urine, ou
même par une pierre dure, et solide, formée par la sortie
par l'ouverture même, et le, l'urine sortant à l'air commun dilaté,
il est fait plus, il y a même quelque fois (et toujours pour
la même indication) introduit de, canaux, pendant longtemps.

Il s'en est aussi employé les injections, lors qu'il s'agit d'abcès
cystiques, fistuleux, comme il arrive souvent, et dont on ne pourroit
suivre le, écoulement, par le moyen des sondes, ou bougies, il vaudroit
d'autant mieux l'apprécier le, dimension pour le déverser par la partie
partie qui l'a vu à prendre, et si alors il le, ont employé, comme
d'ailleurs, il n'en ont jamais abusé.

Après l'usage de l'ell. blanc, ne voyant pas de raison qui eût
dû l'urine se faire tant d'injection, et à la continuation de l'usage,
l'injection étant très faite, comme il en est capable et comme il l'a
fait, la ^{matière} matière auroit de, de la nature, soit elle soit

M^{re} M... aurait attendu, et ne se seroit occupé qu'à l'insu de la nature se
savoir si elle, la dilette s'en étoit fait peu à peu, et je serois bien plus prompt
mais il nous paroit un peu impatient, il ne nous parle que de l'usage des
formes, il se l'attaque par des injections, qu'il oûte 3 fois par jour
pendant 40 jours consécutifs. quel étoit donc son but? avoit-il
lure de dilette? ou de venir à l'impression, que la nature par
-lent pour avoir fait de la partie? Ce seroit alors ignorer les
ressources de la nature, qui dans bien des cas, et même dans les aimes
fermes d'opérer le mort d'avec le vis, d'usage, d'usage, d'usage.
et est-il persuadé que la dilette d'usage, étoit d'être jusqu'au bassin?
Alors quel avantage pourroit-il tirer de tout d'injection, que les bons
praticiens, ou rarement les bons, et avec beaucoup de sagesse dans
des cas, d'usage, qu'il n'ayent été forcés, par quelque chose, de s'opposer, que
nous avons donné, d'usage, à l'usage.
Les injections, presque toujours fatigues d'usage, et de la bourse les
parties, ou elle, sont faites, d'usage, de, d'usage, de, d'usage.
tissu cellulaire d'usage, contre le d'usage, quelle cause pendant
l'établissement de l'usage, le bien, qu'il, l'usage, d'usage.
presque tous les d'usage, la partie, d'usage, d'usage, d'usage.
né, qu'il, imaginer, un l'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
ne fait que d'usage, momentanément la surface de, parties, la si on
n'a pas, ou de le faire, parties, bien, par la pression, ou par la situation,
elle deviendra un corn, l'usage, d'usage, d'usage, d'usage, ou
il faut l'usage, les parties, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
toutes, la nature, alors, par la d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
contenue, d'usage, d'usage, par la d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
Je l'ont, pour, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
1^o qu'il ne s'agisse, qu'il, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
2^o qu'il n'y ait, pas, de communication, pour, la d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
3^o qu'il, fréquente, injections, si, l'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
bien, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
4^o l'usage, que, l'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.
d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage, d'usage.



une fille de 30 ans atteinte depuis 6 mois à cause d'un Rhumatisme douloureux
n'avoir pu calmer les vives douleurs consulta M^{lle} M... elle avait de la fièvre,
elle était d'une maigreur extrême. on donna qu'il venait d'un lieu de
la douleur lui fit soupçonner un abcès caché. Les remèdes, les saignées,
quel qu'il ne fût pas (ce qu'il dit) de fluctuation, il porta profondément
son bistouri à côté de l'os et dans l'endroit le plus tendu de
l'édème, il en sortit un peu de pus, et, à la faveur du doigt de l'autre main,
il cloua l'incision pour donner de la pente à une quantité de matière qui
sortit, et qui lui devint fort pénible qu'il y découvrit un grand d'abcès
ouvert, et plusieurs foyers. la plaie commença le 20^e jour à devenir
vermeille, le 3^e jour elle devint rouge, le 4^e jour elle fut parfaitement guérie
avec des poudres médicamenteuses; mais il ne négligea pas pendant tout ce

tous les injections répétées matin et soir.
M^{lle} M... se rendit pour l'opération l'homme intelligent; il savait qu'il
y a des abcès cachés qui peuvent faire de grands désordres, si on ne les
ouvre pas, ou si on attend pour les ouvrir, que la fluctuation se fasse sentir.
L'édème, ^{qui survient} à la suite de l'abcès, ^{de la supuration} peut pour le déterminer; mais ne pouvant
il pas s'en passer de faire tout d'incision, ou au moins, sans être provoqué
il les envoie s'écouler. C'est une pratique qu'il devrait abandonner à bien
des égards. Je n'en voyais que l'Académie pouvait faire usage, par
l'observation, on qu'il se pose question d'abcès profonds ou cachés.

VIII observation

Il s'agit dans la 8^e observation d'un abcès dans l'articulation du genou.
Il survint à un homme de 30 ans un gonflement considérable au genou
dont qui fut suivi d'une inflammation qui s'étendit jusqu'à la cavité
et qui se termina par un abcès dans l'articulation. M^{lle} M... ouvrit à la
partie latérale externe, par son incision qui se prolongea au-dessus et au
dessous de l'articulation, il pénétra jusqu'à la cavité de l'articulation,
il en sortit beaucoup de pus. on y vit beaucoup de matière purulente
par laquelle les ligaments et la capsule étoient arrêtés l'un sur l'autre. le 3^e jour par les
poudres, et la situation la plaie fut parfaitement cicatrisée
le 10^e jour; cependant les accumulations de la synoviale tenaient
toujours d'en haut, les ligaments, et les ligaments de l'articula-
tion vides et serrés; la douleur étoit devenue très vive. Les douleurs



anodines, et résolutive, en suite, joints à la saignée, ~~les~~ sucs
amers, du régime permiscue peu à peu le mouvement, et
mène au bout d'un an le malade au état de promptitude la
douceur de l'air de Berne.

Cette observation pourroit être très intéressante si elle
était en constance; car on sait que les dépôts dans les
articulations, sont des maladies très graves, & dont la
cure mérite bien une place dans les travaux de l'Académie.

Pourquoy M. M. qui veut y concourir, néglige-t-il d'enq[ui]r m[en]s-
uivre ^{du caractère} ~~de la nature~~ de ces constances, des progrès de la ^{cette} maladie
qui a fait le sujet de son observation? pourquoy ne dit-il rien
des motifs qui l'ont dirigés dans son opération? & si l'on se
trouvait par-tout alors les parties, des changements
quelles ont essuyés pendant le cours du traitement, de la
nature de la supuration?

par exemple comment conceit-il qu'une violence inflammatoire ait
pu subsister près de 3 mois avant de se terminer par un abcès?
nous concevons bien que la tumeur, et le douleur dans une partie
aura pu, par la suite, occasionner une inflammation qui se
seroit terminée par supuration. et la même chose pour le doigt ou
pour le bras, dans l'observation précédente on a vu 6 mois de douleur
vive et rhumatismale dans les lombes, il survint un abcès sur les
muscles. il ne faut pas non plus, si avant l'incision, il suppurait
en dedans de l'articulation, et qu'il en étoient les signes, on ne s'est
qu'après l'incision qu'il lui a été convaincu. quelle raison la détermine
à la faire si grande, ceux qui recommencent tant de la réparer dans des
parties, ou s'il y auroit bien mieux à craindre? qu'est-ce qui l'oblige à
supprimer les septuagies, dans cette constance, sous une seule règle par
un petit nombre de la population? si dans le cours du traitement (qui depuis
l'ouverture ~~de la tumeur~~ a duré trois mois, pendant le quel temps il parait régulier
comme d'un seul pour peu), il ^{n'a pas reconnu} ~~ne s'est pas aperçu~~ les accidents, ^{qu'on découvre} ~~qu'on découvre~~
très souvent dans les dépôts de, articulations, et qui sont presque toujours
les foyers de long des tendons, qui s'étendent jusque au long des muscles,

l'altération de la capsule ligamentaire, de glandes, sinoviales et de cartilages;
effet ordinaire, de la suppuration de la cavité de la jointure de la main de la qualité
de la matière purulente que fournissent ces sortes de foyes et de l'impulsion
de l'air à laquelle elle se soumet lors qu'on répète trop fréquemment les
passives, et même si nous pensons que c'est à fait.
Il nous est dit qu'après la consolidation, le malade ressent des douleurs
douleurs temporaires dans l'articulation, qui dépendent de quelques
ligaments, durs, et vasculaires par l'accumulation de la synovie,
l'ancienne la nouvelle, vide et serrée. nous voyons au contraire (En
réflexion sur la nature de la synovie) qu'elle accumulée dans
l'articulation, bien loin de la rendre et de la serrer, elle l'affaiblit
plutôt, la rend plus souple, les capsules, ligaments, etc. le qui alors
produit un gonflement qu'on appelle fausse ankylose ou
hydropisie de l'articulation et dont il n'est pas question. Il n'y a rien en
plus de raison d'attribuer cet accident à la persistance de cette
synovie, à sa persistance ^{ou à une suite} de l'altération de quelques parties
de l'articulation; mais, ne nous donnant pas lieu de soupçonner
aucune de ces causes, la distension et l'accroissement des liga-
ments qui, par l'accumulation de la synovie, tendent la jointure
vide et serrée, ne peuvent être par conséquent l'effet d'un dépôt
de la cavité d'un dépôt phlegmonique dans le tissu cellulaire ouvert largement, et
par conséquent dans la cavité de la jointure, et de la persistance de
dont le traitement, long et continu, aura été en long repos? L'impulsion
du membre qui se soutient ^{pendant des années} longtemps après la cure de certaines fractures
ne nous prouve-t-elle pas que les sucs se rassemblent dans les articu-
lations et à leur suite conséquence lors que les parties ont été retenues
(dans un long repos) plusieurs mois immobiles? au moins nous
sommes en droit de ne pas prendre notre jugement sur la validité
de l'observation, jusqu'à un plus ample informé d'après le
quel l'Académie pourra ^{en faire usage} faire usage.
IX Observation
La gale de l'articulation est au sujet d'un abîm au poulmon d'une
jeune fille; nous ne pouvons en dire rien.



Une fille de 18 ans se plaignoit d'une douleur fixe et brève au
lobbe droit du poulmon, elle avoit toussé les jours tous de la phtisie.
M^l M^l observa à côté du sternum, entre la 4^e et 5^e des vraies côtes
contant de haut en bas, une tumeur avec fluctuation, qui,
étant comprimée, causoit la suffocation, et faisoit remonter le
sang par la trachée artère; il lui fit l'ouverture avec toutes les
précautions possibles, il n'y eut beaucoup de sang blanc et
liquide, la malade alors tomba dans l'apoplexie, suivie d'elle;
l'appareil fut appliqué, il la pensa guérie 15 jours après on
lui appliqua l'induit de beaucoup de fois pour lui rendre la jeune
doul; au bout de 6 semaines, elle fut libérée et reprit son
travail de couturière qu'elle devoit lui rendre pendant quinze
mois, quoiqu'elle ne se sentait toujours pas guérie. L'ouverture qui
était restée fistuleuse; au bout de quel temps la fièvre la
vainquit, l'appareil la toue revint, et lui rendit la Malade.
M^l M^l... observa qu'après l'écoulement du sang, ayant introduit
une algale par l'ouverture, il avait reconnu un vider d'elle,
dont le fond étoit percé entre la 2^e et 3^e côte inférieure à cette ouverture
une, et qu'après la malade avait voulu se presser la l'ouverture,
il avait pu obtenir une cure radicale.
Mais ne pouvant porter à fait de sa cure, l'opération ne put
d'attention au point d'écoulement qu'il y avait de l'ouverture au
fond du sac; elle avait été fermement satisfait pour l'écoulement
total de la matière purulente qui s'y était accumulée, si la
poulmon (comme s'il y avait toute apparence) n'eût pas été profondément
altéré par les jours qui s'étoient écoulés (comme il a été observé) de
soigner avec l'usage de la substance de la Vitamine, la qui aura
rendu ce rendu possible, presque toujours l'opération
infructueuse. M^l M^l n'a donc fait dans cette occasion que la
bonne pratique, d'attendre que la nature se soit elle-même expulser
la nature se pressant à l'écoulement, il va au devant d'elle; mais la

poumon et la fièvre, quelle l'esperance d'introduire doctes plus vale
arte malum. on ne peut qu'observer l'ordonnance; mais cette maladie
n'est que trop connue de praticiens pour que cette observation puisse
être utile à l'Académie.

X^e Observation

Dans la 10^e observation il est question d'un jeune homme
de 20 ans à qui M. M. ont vu avec un poumon droit
dont la fluctuation se faisait sentir entre les 1^{er} et 2^{es} brachy,
côté contant de bas en haut, dont il sortit beaucoup de pus,
et qui fut guéri du l'écoulement par la seule application de
l'unguent de St. Ermeberg.

par, vuider, tout de cette observation avec les suivantes

XI^e Observation

M. M. rapporte dans la 11^e observation qu'un homme de
45 ans qui a le l'écoulement de pus, par les ouvertures de la Nature,
d'un abcès au poumon qui s'élevait par quatre ouvertures
entre les deux brachy, côté par lequel il sortait beaucoup
d'air. Le malade n'a eu qu'un l'écoulement de pus, que la Bugle
pille.

Ces deux observations mériteroient bien des regards et
viendroient à l'appuy de tant d'autres qui sont formées à la
Chirurgie, et qui viennent donner aux bienfaits de la Nature,
si elles n'étoient pas dénuées de tout, les circonstances qui
paraissent pour l'avenir que le poumon était abscédé.

On voit souvent de ces abcès qui (à la faveur de l'adhérence, que
le l'écoulement avait contracté avec le plevre) se montrent au
dehors après avoir détruit cette membrane et le muscle intercostal
avec le plevrisme avantageux, même aidé de l'usage des procédés
d'écoulement comme d'un l'écoulement d'écoulement. Leur guérison peut
être dans le cas; mais il ne s'explique pas, peut-on regarder



pend pendant plusieurs heures. Les derniers bourdonnets tombèrent
le 8^e jour, et la guérison fut parfaite le 10^e mois.

Qu'y a-t'il d'absolument nécessaire dans cette observation?

C'est sans doute l'ouverture du cordon dans l'anneau qui donna
lieu à une hémorragie considérable laquelle il parvint difficilement

d'appliquer la ligature, que l'agave n'aurait pu exprimer, et

qui fut enfin arrêtée par l'eau alumineuse, la poudre

d'alun, les blancs d'œufs dont les bourdonnets étaient imprégnés,

aidés d'une solide compression, et surtout pendant quelques

jours, par main de maître puis que l'état par celui de M.

Jestors, cependant, qui on fait attention au calibre naturel

de l'artère spermatique (le cordon ^{et le} testicule n'étant ni

écharré ni autrement affecté, que par une plaie récente)

on aura de la peine à concevoir qu'il ait fallu tant d'appareil

pour arrêter le sang, et comme l'agave, dans le cas,

appliqué et continu avec méthode, aura manqué son

effet, tandis que dans des cas graves, il agit bien plus

efficacement, et bien plus doucement que les stiptiques

donc M. Jestors.

Je suppose cependant toujours, comme il le dit, que

l'ouverture du cordon étoit dans l'anneau, et qu'il auroit

été difficile de porter une ligature au-dessus sans le

dilater (ce qu'il eût fait si les stiptiques eussent manqué)

on sera toujours étonné comment les remèdes qui n'opé-

-rent qu'à l'aide de la compression, ont réussi dans un cas

où l'artère ouverte, et donnant avec force, ne parvint

Offrir qu'un peu de résistance, puis que l'état dans

l'anneau; mais il fallut prendre un parti, c'étoit le



comme digne pathognomonique d'abcès dans la substance
d'apoplexie, d'après ou d'clair qui sortent par un ou plu-
sieurs ouvertures à la circonférence de la poitrine? Les symptômes
n'appartiennent-ils pas, aussi à ceux qui se forment dans le
tissu cellulaire de la plèvre, et qui se manifestent à l'exter-
ieur? il fallor donc des signes distinctifs. Cependant dans
la supposition que les abcès dont il parle étoient de cette
dernière classe, lesont toujours de, maladies graves,
et dont les observations auroient pu servir à l'Académie
si elles eussent été travaillées.

XII^e observation

La 12^e observation nous apprend l'ouverture du cordon spermatique
dans l'anneau avec plaie considérable au testicule.
Un jeune homme de 19 ans, reçut plusieurs coups de canif dans
le Scrotum, le testicule droit, qui étoit lorsqu'il étoit vers l'anneau
par le haut, ne tenoit plus qu'à un reste de filon, et
pouvoit sortir de la plaie. Le cordon étoit ouvert dans l'anneau,
et le testicule perdit beaucoup de sang.

M^r de l'Écluse, l'ayant séparé du testicule qu'il n'étoit pas
possible de conserver, le qualade ne s'y fut opposé, mais ce
n'étoit que partie venant, car il le sépara le 3^e jour.

Ce qui le occupa le plus étoit l'ouverture du cordon dans
l'anneau par laquelle j'appliquai de l'agaric qui ne réussit pas,
malgré la compression et le bandage particuliers qu'il en
dovait avoir. J'y substituai d'autres remèdes,
il mit sur l'ouverture des bouillons trempés dans l'eau
alumineuse par trois à quatre fois, et par une plus grande sucrée,
il se recouvrit du plumage avec trempés dans le blanc d'œuf
battu avec le même powder. il y appliqua un appareil et
un bandage solide qu'il sentoit lui-même avec sa main

plus d'un, et qui luy a vécu. peut être aussi que le
pubis, dans que M^r M... s'en soit appesuy, se fera un peu
pitié pour avoir par un succès.
avec la meilleure intention, et tous les regards que nous
avons pour M^r M... nous ne croyons pas pouvoir prés-
enter à l'Académie aucune de ses observations, dans l'état
où elles sont, comme assez intéressante. Dans les unes,
les faits rapportés n'offrent rien d'extraordinaire.
celles qui pourroient jeter quelques lumières sur si-
ples circonstances qu'elles n'instruisent pas, ou qu'elles
mettent le Lecteur dans le cas de douter de l'exactitude
des observations. Dans d'autres l'usage (faute de mot) ou
la conduite) il nous paroit abuser un peu trop des
moyens que la science pratique permet. Nous croyons
cependant qu'elle pourroit faire mention, par l'extrait,
de la première et septième qui, comme les autres,
auroient besoin d'être travaillées.

non, nous persuadons que M^r Maignon, qui est
observateur, voudroit s'en occuper, et satisfaire aux
reflexions qu'on luy fera faire, elles deviendroient
utiles à l'Académie qui ne se propose que l'occasion de
couronner ses travaux. Le 26 May 1763

A M^r Bertin